

## Ergebnisse der Zählungen „Stunde der Wintervögel“

Vom 6. bis 9. Januar 2011 fand die erste bundesweite „Stunde der Wintervögel“ statt, die eine große Resonanz hatte. Von 85.000 Teilnehmern wurden rund 2,6 Millionen Vögel aus mehr als 56.000 Gärten gemeldet ([www.nabu.de](http://www.nabu.de)). Im Mittelpunkt der Zählungen standen die vielen Menschen vertrauten und oft weit verbreiteten Vogelarten.

Auch in Obertshausen haben sich Bürgerinnen und Bürger an der Aktion beteiligt. Zudem erreichten uns Anrufe und Meldungen aus den Nachbarkommunen Heusenstamm, Rodgau und Mühlheim. Ganz überwiegend wurden die Ergebnisse aber direkt an den Bundesverband gemeldet. Für die Beteiligung bedanken wir uns vielmals!

Die Auswertung für den Kreis Offenbach ergab, dass von 183 Vogelfreunden in 118 Gärten 4822 Vögel gezählt worden sind. Nachstehend die Liste der 20 am häufigsten beobachteten Vogelarten.

| Rang | Vogelart     | Anzahl der Vögel (gesamt) | in % der Gärten | Beobachtung (Anzahl der Vögel pro Garten) |
|------|--------------|---------------------------|-----------------|---|
| 1    | Kohlmeise    | 687                       | 91,53%          | 5,82                                      |
| 2    | Amsel        | 533                       | 96,61%          | 4,52                                      |
| 3    | Blaumeise    | 486                       | 82,2%           | 4,12                                      |
| 4    | Star         | 394                       | 38,98%          | 3,34                                      |
| 5    | Haussperling | 386                       | 36,44%          | 3,27                                      |

Die beiden Spitzenreiter: Kohlmeise (links) und Amsel.

Fotos: P. Erlemann, 27.12.2010



| Rang | Vogelart     | Anzahl der Vögel (gesamt) | in % der Gärten | Beobachtung (Anzahl der Vögel pro Garten) |
|------|--------------|---------------------------|-----------------|---|
| 6    | Buchfink     | 315                       | 59,32%          | 2,67                                      |
| 7    | Grünfink     | 297                       | 50%             | 2,52                                      |
| 8    | Erlenzeisig  | 159                       | 13,56%          | 1,35                                      |
| 9    | Ringeltaube  | 151                       | 33,9%           | 1,28                                      |
| 10   | Elster       | 143                       | 49,15%          | 1,21                                      |
| 11   | Rotkehlchen  | 140                       | 83,05%          | 1,19                                      |
| 12   | Feldsperling | 140                       | 17,8%           | 1,19                                      |
| 13   | Eichelhäher  | 121                       | 59,32%          | 1,03                                      |
| 14   | Kleiber      | 89                        | 47,46%          | 0,75                                      |
| 15   | Rabenkrähe   | 84                        | 23,73%          | 0,71                                      |
| 16   | Straßentaube | 80                        | 9,32%           | 0,68                                      |
| 17   | Stieglitz    | 63                        | 12,71%          | 0,53                                      |
| 18   | Schwanzmeise | 62                        | 11,02%          | 0,53                                      |
| 19   | Buntspecht   | 62                        | 42,37%          | 0,53                                      |
| 20   | Haubenmeise  | 51                        | 24,58%          | 0,43                                      |



Stare am Futterbrett, 21.12.2010



Erlenzeisig - ein seltener Gast, 12.2.2011



Ringeltaube an Fütterstelle, 31.12.2010



Eichelhäher äugt in den Garten, 1.1.2011

alle Fotos: P. Erlemann



Nordische Schwanzmeisen erkennt man am reinweißen Kopf, dem scharf begrenzten Nacken und großen weißen Flügelfeld.

Fotos: P. Erlemann, 27.2.2011

Der Buntspecht ist der häufigste Vertreter seiner Sippe.

