

## Ergebnisse der Wasservogelzählungen im Winterhalbjahr 2007/2008

Mit insgesamt 1257 Individuen aus 15 Vogelarten wurden die Ergebnisse aus der vorjährigen Zählseason (1141 Individuen aus 12 Arten) übertroffen. Stockente und Blässhuhn waren erneut die häufigsten Arten. An dritter Stelle rangiert diesmal die Krickente, nachdem der Kormoran zuvor noch diesen Rang eingenommen hatte. Kolbenente und Prachtttaucher waren in dieser Saison Besonderheiten.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

	17.9.	14.10.	18.11.	16.12	13.01.	17.02.	16.03.	13.04.	Summe
Höckerschwan		2	5	2	2			2	13
Schnatterente			3	4	3	5			15
Pfeifente		1							1
Krickente		3	22	41	21	31	14	25	157
Stockente	33	79	90	100	110	111	25	8	556
Löffelente								3	3
Kolbenente					1				
Tafelente			6		2		1		9
Reiherente	3	4	4	33	2	9	9	8	42
Zwergtaucher			1	3					4
Haubentaucher	1	1	3	3	2	3	6	4	23
Prachtttaucher				1					1
Kormoran	6	19	36	31	4	12	5	4	117
Teichhuhn		4	4	2	2			3	15
Blässhuhn	25	30	42	43	56	51	35	18	300
<b>Summe</b>	<b>68</b>	<b>143</b>	<b>216</b>	<b>233</b>	<b>205</b>	<b>222</b>	<b>95</b>	<b>75</b>	<b>1257</b>
<b>Gänsezählung</b>									
Kanadagans		22	5		35	16	11	17	<b>106</b>
Graugans	8	6	6	6	8	6	2	6	<b>48</b>
Nilgans	6	16	3	2		2	3	2	<b>34</b>
<b>Weitere Arten:</b>									
Rohrdommel					1	1	2		<b>4</b>
Graureiher	7	4	3	3	1	3	8		<b>29</b>
Wasserralle		1		2				1	<b>4</b>
Eisvogel	3	2	1	1		1	1	1	<b>10</b>



Auch in diesem Winter zählten Beobachtungen der Rohrdommel zu den Höhepunkten!

Das „Highlight“ unter den Schwimmvögeln war der junge Prachtaucher am Zähltermin im Dezember.

(Fotos: P. Erlemann)

